



АЛГОРИТМ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПАРАТА ПРИ КАШЛЕ *



Действующее вещество: Эрдостеин, 300 мг

Форма выпуска: Капсулы, 10 шт. в упаковке

Способ применения:

1 капсула 2 раза в сутки, не зависит от приема пищи

Рекомендованная длительность приема:

5 дней. Если нет улучшения в течение 5 дней после начала применения препарата или если наступит ухудшение, необходимо обратиться к лечащему врачу



НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА СЛИЗИстую ЖКТ



НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ



НЕ ТРЕБУЕТ РАЗВЕДЕНИЯ В ВОДЕ

СРАВНЕНИЕ ЭРДОСТЕИН С ДРУГИМИ МУКОЛИТИКАМИ

МНН	Эрдостеин ¹	Ацетилцистеин ²	Амброксол ³	Бромгексин ⁴	Карбоцистеин ⁵
Муколитическое действие	✓	✗	✓	✓	✓
Мукорегуляторная активность	✓	✗	✓	✓	✗
Мукокинетическое действие	✓	✗	✓	✓	✓
Антиоксидантный эффект	✓	✓	✗	✗	✗
Иммуномодулирующее действие	✓	✗	✗	✗	✓
Использование при заболеваниях ЖКТ	✓	ЯБ желудка / 12-перстной кишки в анамнезе с осторожностью	✓	ЯБ желудка / 12-перстной кишки в анамнезе	ЯБ желудка / 12-перстной кишки в анамнезе с осторожностью
Потенцирование действия антибиотиков	✓	✗	✓	✓	✓
Интервал после приема АБ	✗	2-3 часа	✗	✗	✗
Частые побочные и другие нежелательные действия	✗	✗	Тошнота	Усиливает раздражающее действие НПВС на ЖКТ	✗

1. Инструкция по применению Эльмуцин®
 2. Инструкция по применению АЦЦ® Лонг 600 мг, шипучие таблетки
 3. Инструкция по применению Лазолван® Макс, капсулы
 4. Инструкция по применению Бромгексин 8 Берлин-Хеми® таблетки
 5. Инструкция по применению Флуифорт®

*Адаптация статьи "Алгоритм выбора средств для лечения кашля" И.Л. Клячкина, И.П. Смирнов Кафедра пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, 2017
 **КВБА - кашлевой вариант бронхиальной астмы
 ***ГЭРБ - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь